

## KLASIFIKASI NEAR-RING *Classifications of Near Ring*

ELVINUS RICHARD PERSULESSY

Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Pattimura  
Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti, poka-Ambon  
E-mail: richardelvinus@yahoo.com

### ABSTRAK

Sebagaimana pada grup dan ring, struktur-struktur baru yang berkaitan dengan keduanya dapat dibentuk dengan menambahkan ciri-ciri baru pada kedua struktur tersebut. Ciri-ciri baru inilah yang berperan dalam membentuk klasifikasi grup dan ring. *Near-ring* sebagai salah satu struktur yang terbentuk dari ring mengalami hal yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan jenis-jenis *near-ring* yang berperan dalam mengklasifikasi *near-ring* dan karakteristik yang timbul sebagai akibatnya, terutama yang berkaitan dengan ketunggalan elemen identitas dan invers.

**Kata kunci:** *Klasifikasi, Near-ring, Ring.*

### PENDAHULUAN

Himpunan  $R \neq \emptyset$  disebut ring jika terhadap operasi penjumlahan  $R$  merupakan grup abelian, terhadap operasi perkalian  $R$  tertutup dan asosiatif serta pada  $R$  berlaku sifat distributif. Jika  $N \neq \emptyset$  adalah himpunan yang memiliki semua syarat untuk menjadi ring kecuali sifat komutatif dan distributif kiri, maka  $N$  disebut *near-ring*.

*Near-ring* memiliki banyak sifat yang diperoleh dengan cara membandingkan sifat-sifat yang ada dalam ring. Sifat-sifat tersebut bisa saja sama dengan sifat-sifat yang ada dalam ring, namun ada juga yang sangat berbeda. Perbedaan dan persamaan sifat inilah yang membentuk klasifikasi pada *near-ring* yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### TINJAUAN PUSTAKA

Dalam perkembangan Matematika Aljabar khususnya teori ring, L. Dickson memperkenalkan konsep *near-field*. Konsep ini membicarakan tentang lapangan yang hanya memenuhi salah satu dari sifat distribusi (distribusi kiri atau distribusi kanan). Selanjutnya, sekitar tahun 1930, Wietlandt menggunakan konsep ini untuk menyusun syarat-syarat untuk mengembangkan konsep *near-ring* [2].

Dalam bukunya yang berjudul "*Near-Rings*", Günter Pilz memberikan pemahaman mendasar tentang *near-ring* melalui definisi dan contoh. Ia juga membandingkan sifat-sifat yang ada dalam ring untuk disesuaikan dalam konsep *near-ring* dan menghasilkan sifat-sifat yang baru. [2]

#### Definisi 1.

Diberikan  $G \neq \emptyset$ . Pada  $G$  didefinisikan operasi biner " $*$ ".  $G$  disebut grup terhadap terhadap operasi biner " $*$ " jika memenuhi sifat

- Tertutup ( $\forall g_1, g_2 \in G$ )  $g_1 * g_2 \in G$ .
- Asosiatif  
( $\forall g_1, g_2, g_3 \in G$ )  $(g_1 * g_2) * g_3 = g_1 * (g_2 * g_3)$ .
- Ada elemen netral  
( $\exists e \in G$ ) ( $\forall g \in G$ )  $e * g = g * e = g$ .
- Setiap elemen memiliki invers  
( $\forall g \in G$ ) ( $\exists g^{-1} \in G$ )  $g * g^{-1} = g^{-1} * g = e$

Himpunan  $G$  yang membentuk grup terhadap operasi " $*$ " yang didefinisikan padanya dinotasikan dengan  $(G, *)$ .

#### Definisi 2.

Misalkan  $(G, *)$  adalah grup.  $G$  disebut grup abelian jika memenuhi sifat komutatif, yaitu

$$(\forall g_1, g_2 \in G) g_1 * g_2 = g_2 * g_1$$

**Definisi 3.**

Himpunan  $S \neq \emptyset$  merupakan semigrup terhadap operasi biner "\*" jika memenuhi sifat

- a. Tertutup ( $\forall s_1, s_2 \in S$ )  $s_1 * s_2 \in S$ .
- b. Asosiatif  
 $(\forall s_1, s_2, s_3 \in S) (s_1 * s_2) * s_3 = s_1 * (s_2 * s_3)$ .

Himpunan  $S$  yang membentuk semigrup terhadap operasi "\*" yang didefinisikan padanya dinotasikan dengan  $(S, *)$ .

**Definisi 4.**

Diberikan himpunan  $R \neq \emptyset$ . Pada  $R$  didefinisikan operasi-operasi biner "+" dan ".". Himpunan  $R$  disebut ring terhadap kedua operasi biner tersebut, jika :

- I. Terhadap operasi "+",  $(R, +)$  adalah grup abelian.
- II. Terhadap operasi "." memenuhi sifat
  - i). Tertutup ( $\forall a, b \in R$ )  $a \cdot b \in R$ .
  - ii). Asosiatif ( $\forall a, b, c \in R$ )  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ .
- III. i). Distributif Kiri  
 $(\forall a, b, c \in R) a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ .
- ii). Distributif Kanan  
 $(\forall a, b, c \in R) (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ .

Himpunan  $R$  yang membentuk ring terhadap operasi penjumlahan dan pergandaan yang didefinisikan padanya dinotasikan dengan  $(R, +, \cdot)$ .

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Near-Ring****Definisi 5.**

Diberikan himpunan  $N \neq \emptyset$ . Pada  $N$  didefinisikan operasi-operasi biner "+" dan ".". Himpunan  $N$  disebut *near-ring* terhadap kedua operasi biner tersebut, jika memenuhi :

- i).  $(N, +)$  adalah grup.
- ii).  $(N, \cdot)$  adalah semigrup.
- iii). Distributif kanan  
 $(\forall a, b, c \in N) (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$

Himpunan  $N$  yang membentuk *near-ring* terhadap operasi penjumlahan dan pergandaan yang didefinisikan padanya dinotasikan dengan  $(N, +, \cdot)$ .

Contoh 1:

Misalkan  $(G, +)$  grup, maka  $F(G) = \{f : G \rightarrow G\}$  (himpunan semua fungsi dari  $G$  ke  $G$ ) merupakan *near-ring* terhadap operasi penjumlahan dan komposisi fungsi dengan aturan sebagai berikut :

- $$(\forall f, g \in F(G)) (\forall x \in G)$$
- i).  $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ .
  - ii).  $(f \circ g)(x) = f[g(x)]$ .

**Bukti**

I.  $(F(G), +)$  grup.

- a. Tertutup  
 Ambil sebarang  $f, g \in F(G)$ .  
 Akan ditunjukkan  $f + g \in F(G)$ .  
 $f \in F(G) \Leftrightarrow f(x) \in G$  dan  
 $g \in F(G) \Leftrightarrow g(x) \in G$ .  
 $f + g \in F(G) \Leftrightarrow (f + g)(x) \in G$   
 Ambil sebarang  $x \in G$ , maka  
 $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$   
 Karena  $f(x) \in G$ ,  $g(x) \in G$  dan  $G$  grup maka  
 $f(x) + g(x) \in G$ .  
 Karena  $f(x) + g(x) \in G$  maka  $(f + g)(x) \in G$   
 atau  $f + g \in F(G)$ .

b. Asosiatif

Ambil sebarang  $f, g, h \in F(G)$ .  
 Akan ditunjukkan  $(f + g) + h = f + (g + h)$ .  
 Ambil sebarang  $x \in G$ , maka  

$$\begin{aligned} [(f + g) + h](x) &= (f + g)(x) + h(x) \\ &= (f(x) + g(x)) + h(x) \\ &= f(x) + (g(x) + h(x)) \\ &= f(x) + (g + h)(x) \\ &= [f + (g + h)](x) \end{aligned}$$

Berdasarkan sifat kesamaan dua fungsi maka terbukti  $(f + g) + h = f + (g + h)$ .

c. Terdapat elemen netral

Ambil sebarang  $f \in F(G)$ .  
 Akan ditunjukkan terdapat  $g \in F(G)$  sehingga  
 $f + g = g + f = f$ .  
 Ambil sebarang  $x \in G$  maka  
 $(f + g)(x) = f(x)$   
 $f(x) + g(x) = f(x)$   
 karena  $f(x) \in G$  dan  $G$  grup maka  
 $-f(x) \in G$ .  
 $-f(x) + f(x) + g(x) = -f(x) + f(x) + g(x)$   

$$\begin{aligned} 0 + g(x) &= 0 \\ g(x) &= 0 \\ g(x) &= O(x) \end{aligned}$$

dimana  $(\forall x \in G) O(x) = 0$ .

Menurut kesamaan dua fungsi diperoleh  $g = O$ .

Bukti untuk  $g + f = f$  sejalan.

d. Setiap elemen punya invers

Ambil sebarang  $f \in F(G)$ .

Akan ditunjukkan terdapat  $f^{-1} \in F(G)$

sehingga  $f + f^{-1} = f^{-1} + f = O$ .

Ambil sebarang  $x \in G$  maka

$$(f + f^{-1})(x) = O(x)$$

$$f(x) + f^{-1}(x) = O(x)$$

$$f(x) + f^{-1}(x) = 0$$

karena  $f(x) \in G$  dan  $G$  grup maka  $-f(x) \in G$ .

$$-f(x) + f(x) + f^{-1}(x) = -f(x) + 0$$

$$f^{-1}(x) = -f(x)$$

Menurut kesamaan dua fungsi diperoleh  $f^{-1} = -f$ .

Bukti untuk  $f^{-1} + f = O$  sejalan.

II.  $(F(G), \circ)$  semigrup.

a. Tertutup

Ambil sebarang  $f, g \in M(G)$ .

Akan ditunjukkan  $f \circ g \in F(G)$ .

$$f \in F(G) \Leftrightarrow f(x) \in G \text{ dan}$$

$$g \in F(G) \Leftrightarrow g(x) \in G.$$

$$f \circ g \in F(G) \Leftrightarrow (f \circ g)(x) \in G$$

Ambil sebarang  $x \in G$  maka

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)]$$

Karena  $g(x) \in G$  maka  $f[g(x)] \in G$ .

Karena  $f[g(x)] \in G$  maka  $(f \circ g)(x) \in G$

atau  $f \circ g \in F(G)$ .

b. Asosiatif

Ambil sebarang  $f, g, h \in F(G)$ .

Akan ditunjukkan  $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ .

Ambil sebarang  $x \in G$  maka

$$[(f \circ g) \circ h](x) = (f \circ g)[h(x)]$$

$$= f[g(h(x))]$$

$$= f[(g \circ h)(x)]$$

$$= [f \circ (g \circ h)](x)$$

Berdasarkan sifat kesamaan dua fungsi maka terbukti  $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ .

III. Distributif Kanan

Ambil sebarang  $f, g, h \in F(G)$ .

Akan ditunjukkan  $(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h$ .

Ambil sebarang  $x \in G$ , maka

$$[(f + g) \circ h](x) = (f + g)[h(x)]$$

$$= f[h(x)] + g[h(x)]$$

$$= (f \circ h)(x) + (g \circ h)(x)$$

$$= [f \circ h + g \circ h](x)$$

Berdasarkan sifat kesamaan dua fungsi maka terbukti  $(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h$ .

Berdasarkan I, II dan III terbukti bahwa  $(F(G), +, \circ)$  *near-ring*.

Pada contoh ini distributif kiri tidak berlaku karena

$$[f \circ (g + h)](x) = f[(g + h)(x)]$$

$$= f[g(x) + h(x)]$$

Namun, belum tentu

$$f[g(x) + h(x)] = f[g(x)] + f[h(x)].$$

Terlihat bahwa fungsi  $f$  harus linier atau homomorfisma agar memenuhi kondisi di atas.

Contoh 2:

Telah diketahui bahwa  $(\mathbb{R}, +)$ ,  $(\mathbb{Q}, +)$  dan  $(\mathbb{Z}, +)$  masing-masing merupakan grup. Berdasarkan Contoh 1, maka dapat diperoleh  $(F(\mathbb{R}), +, \circ)$ ,  $(F(\mathbb{Q}), +, \circ)$  dan  $(F(\mathbb{Z}), +, \circ)$  masing-masing merupakan *near-ring*.

Contoh 3:

Berdasarkan Contoh 1 juga dapat diperoleh bahwa

$$F_0(G) = \{f : G \rightarrow G \mid f(0) = 0\}$$

merupakan *near-ring* terhadap operasi penjumlahan "+" dan komposisi "o" fungsi.

Contoh 4:

Diberikan  $(G, +)$  grup. Pada  $G$  didefinisikan operasi "." sebagai berikut

$$(\forall a, b \in G) a \cdot b = a$$

Dapat ditunjukkan bahwa  $(G, +, \cdot)$  merupakan *near-ring*.

**Bukti**

I.  $(G, +)$  grup.

Jelas dari yang diketahui.

II.  $(G, \cdot)$  semigrup

a. Tertutup

Ambil sebarang  $a, b \in G$ .

Akan ditunjukkan  $a \cdot b \in G$ .

Karena  $a \cdot b = a$  dan  $a \in G$  maka terbukti  $a \cdot b \in G$ .

b. Asosiatif

Ambil sebarang  $a, b, c \in G$ .

Akan ditunjukkan  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ .

$$\begin{aligned}(a \cdot b) \cdot c &= a \cdot b \\ &= a \cdot (b \cdot c)\end{aligned}$$

III. Distributif kanan

Ambil sebarang  $a, b, c \in G$ .

Akan ditunjukkan  $(a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ .

$$\begin{aligned}(a+b) \cdot c &= a+b \\ &= a \cdot c + b \cdot c\end{aligned}$$

Berdasarkan I, II dan III terbukti bahwa  $(G, +, \cdot)$  *near-ring*.

Contoh 5:

Jelas bahwa semua ring pasti merupakan *near-ring*.

### Sifat-sifat Dasar *Near-ring*

Pada bagian ini akan dibahas sifat-sifat dasar dari *near-ring* yang berkaitan dengan elemen netral dan invers terhadap penjumlahan.

#### Teorema 1.

Jika  $N$  *near-ring* dan 0 elemen netral terhadap penjumlahan, maka  $(\forall a, b, c \in N)$  berlaku

- i).  $-(a+b) = -b - a$ .
- ii).  $0 \cdot a = 0$ .
- iii).  $(-a)b = -ab$ .
- iv).  $(a-b)c = ac - bc$

Tiga bagian pertama dari Teorema 1 di atas memperlihatkan perbedaan antara ring dan *near-ring*. Bagian pertama muncul karena pada *near-ring* tidak berlaku sifat abelian, sedangkan pada bagian kedua dan ketiga belum tentu berlaku  $a \cdot 0 = 0$  dan  $a(-b) = -ab$ . Hal ini dapat diperlihatkan dengan contoh berikut.

Contoh 6:

Telah diketahui  $(M(\mathbb{R}), +, \circ)$  *near-ring*.

Ambil  $f, O \in (M(\mathbb{R}), +, \circ)$

dimana  $(\forall x \in \mathbb{R})$

$$f(x) = 3x + 2 \text{ dan } O(x) = 0.$$

Selanjutnya,

$$(f \circ O)(x) = f[O(x)] = f(0) = 3 \cdot 0 + 2 = 2 \neq O(x)$$

Contoh 7:

Telah diketahui  $(M(\mathbb{R}), +, \circ)$  *near-ring*.

Ambil sebarang  $f, g \in (M(\mathbb{R}), +, \circ)$

dimana  $(\forall x \in \mathbb{R})$

$$f(x) = x^2 \text{ dan } g(x) = x + 2.$$

$$\begin{aligned}[f \circ (-g)](x) &= f[-g(x)] \\ &= f[-(x+2)] \\ &= f[-x-2] \\ &= (-x-2)^2 \\ &= x^2 + 4x + 4\end{aligned}$$

sedangkan,

$$\begin{aligned}-[f \circ g](x) &= -f[g(x)] \\ &= -f(x+2) \\ &= -(x+2)^2 \\ &= -(x^2 + 4x + 4) \\ &= -x^2 - 4x - 4\end{aligned}$$

Sehingga diperoleh  $f \circ (-g) \neq -(f \circ g)$ . Untuk kasus ini fungsi  $f$  haruslah merupakan fungsi ganjil agar berlaku

$$f \circ (-g) = -(f \circ g).$$

Berdasarkan kasus pada Contoh 6 maka muncul definisi berikut.

#### Definisi 6.

Diberikan  $(N, +, \cdot)$  *near-ring*.

Himpunan  $N_0 = \{a \in N \mid a \cdot 0 = 0\}$  disebut simetris nol bagian dari  $N$ .

Jika  $N = N_0$  maka  $N$  disebut simetris nol.

Contoh 8:

Telah diketahui  $F(G)$  *near-ring*, maka

$$F_0(G) = \{f : G \rightarrow G \mid f(0) = 0\}$$

merupakan simetris nol bagian dari  $F(G)$ .

Contoh 9:

Jelaslah bahwa semua ring pasti merupakan simetris nol.

### Klasifikasi *Near-ring*

Berdasarkan definisi *near-ring* dapat dilihat bahwa untuk menjadi *near-ring*, himpunan  $N$  tidak harus memenuhi sifat komutatif terhadap operasi "+" dan "." serta tidak harus mempunyai elemen satuan terhadap operasi ".". Pada bagian ini akan membahas lebih jauh tentang jenis-jenis *near-ring*.

Mengawali bagian ini akan diberikan definisi penting tentang *near-ring* abelian.

#### Definisi 7.

Suatu *near-ring*  $N$  dikatakan *near-ring* abelian jika  $N$  memenuhi sifat komutatif terhadap operasi "+", yaitu

$$(\forall a, b \in N) a + b = b + a$$

Contoh 10:

Telah diketahui  $(F(\mathbb{R}), +, \cdot)$  dan  $(F(\mathbb{Z}), +, \cdot)$  adalah *near-ring*. Terhadap operasi "+",  $\mathbb{R}$  dan  $\mathbb{Z}$  juga memenuhi sifat komutatif, maka  $(F(\mathbb{R}), +, \cdot)$  dan  $(F(\mathbb{Z}), +, \cdot)$  merupakan *near-ring* abelian.

### Definisi 8

Suatu *near-ring*  $N$  dikatakan *near-ring* distributif jika  $N$  memenuhi sifat distributif kiri, yaitu

$$(\forall a, b, c \in N) a(b+c) = ab+ac$$

Contoh 11:

Himpunan  $F_0(G) = \{f : G \rightarrow G \mid f(0) = 0\}$  merupakan *near-ring* distributif.

### Bukti

Dari Contoh 3 telah diketahui bahwa  $F_0(G)$  merupakan *near-ring*.

Akan ditunjukkan pada  $F_0(G)$  berlaku sifat distributif kiri atau

$$(\forall f, g, h \in F_0(G)) f \circ (g+h) = (f \circ g) + (f \circ h)$$

Ambil sebarang  $f, g, h \in F_0(G)$ .

$$\begin{aligned} [f \circ (g+h)](0) &= f[(g+h)(0)] \\ &= f[g(0)+h(0)] \\ &= f(0+0) \\ &= f(0) \\ &= 0 \\ &= 0+0 \\ &= f(0)+f(0) \\ &= f(g(0))+f(h(0)) \\ &= [f \circ g](0)+[f \circ h](0) \\ &= [(f \circ g)+(f \circ h)](0) \end{aligned}$$

Dengan menggunakan sifat kesamaan dua fungsi maka terbukti

$$f \circ (g+h) = (f \circ g) + (f \circ h).$$

Contoh 12:

Jelaslah bahwa setiap ring pasti merupakan *near-ring* distributif.

### Definisi 9

Suatu *near-ring*  $N$  dikatakan *near-ring* komutatif jika  $N$  memenuhi sifat komutatif terhadap operasi " $\cdot$ ", yaitu

$$(\forall a, b \in N) ab = ba$$

Contoh 13:

Himpunan

$$F_0(G) = \{f : G \rightarrow G \mid f(0) = 0\}$$

merupakan *near-ring* komutatif.

Contoh 14:

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ,  $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ ,  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ ,  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$  merupakan *near-ring* komutatif dengan "+" dan " $\cdot$ " berurut-turut adalah operasi penjumlahan dan pergandaan pada himpunan  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$  dan  $\mathbb{C}$ .

Karena *near-ring* dikembangkan dari ring, maka terdapat hubungan antara dua struktur tersebut. Hal ini akan diperlihatkan oleh teorema berikut.

### Teorema 2.

Misalkan  $(N, +, \cdot)$  *near-ring*.

- i).  $N$  abelian dan komutatif jika dan hanya jika  $N$  ring komutatif.
- ii).  $N$  abelian dan distributif jika dan hanya jika  $N$  ring.
- iii). Jika  $N$  distributif dan  $N \cdot N = N$  maka  $N$  ring

### Bukti

- i).  $\Rightarrow$ ). Diketahui  $N$  *near-ring* abelian dan komutatif.

Akan ditunjukkan  $N$  ring komutatif

Karena  $N$  *near-ring* abelian maka cukup ditunjukkan bahwa pada  $N$  berlaku sifat distributif kiri atau

$$(\forall a, b, c \in N) a(b+c) = ab+ac$$

Ambil sebarang  $a, b, c \in N$ .

Karena  $N$  *near-ring* maka berlaku sifat distributif kanan

$$(b+c)a = ba+ca$$

Karena  $N$  *near-ring* komutatif maka

$$(b+c)a = a(b+c) \text{ dan } ba+ca = ab+ac$$

Jadi diperoleh  $a(b+c) = ab+ac$ .

Karena pada  $N$  berlaku sifat abelian dan distributif kiri maka terbukti bahwa  $N$  ring. Karena  $N$  *near-ring* komutatif maka terbukti bahwa  $N$  ring komutatif.

- $\Leftarrow$ ). Diketahui  $N$  ring komutatif.

Akan ditunjukkan  $N$  *near-ring* abelian dan komutatif.

Karena  $N$  ring komutatif maka jelas bahwa  $N$  *near-ring* abelian dan komutatif.

- ii).  $\Rightarrow$ ). Diketahui  $N$  *near-ring* abelian dan distributif.

Akan ditunjukkan  $N$  ring.

Karena  $N$  distributif maka pada  $N$  berlaku sifat distributif kiri.

Karena pada  $N$  berlaku sifat abelian dan distributif kiri maka terbukti bahwa  $N$  ring.

- $\Leftarrow$ ). Diketahui  $N$  ring.

Akan ditunjukkan  $N$  *near-ring* abelian dan distributif.

Karena  $N$  ring maka jelas terbukti bahwa  $N$  *near-ring* abelian dan distributif.

iii). Diketahui  $N$  distributif dan  $N \cdot N = N$ .

Akan ditunjukkan  $N$  ring.

Akan digunakan bagian ii). di atas untuk membuktikannya.

Telah diketahui bahwa  $N$  distributif maka tinggal dibuktikan bahwa  $N$  abelian.

Ambil sebarang  $m, n \in N$ .

Harus ditunjukkan bahwa  $m+n = n+m$ .

Karena  $m, n \in N$  dan  $N \cdot N = N$  maka

$$(\exists a, b, c, d \in N) m = ab \text{ dan } n = cd.$$

Selanjutnya,

$$(a+c)(d+b) = ad + ab + cd + cb$$

dan

$$(a+c)(d+b) = ad + cd + ab + cb$$

sehingga

$$ad + ab + cd + cb = ad + cd + ab + cb$$

$$(-ad) + ad + ab + cd + cb + (-bc)$$

$$= (-ad)ad + cd + ab + cb + (-bc)$$

$$ab + cd = cd + ab$$

$$m + n = n + m$$

Terbukti bahwa  $N$  abelian.

Jadi, karena pada  $N$  berlaku sifat abelian dan distributif kiri maka terbukti  $N$  ring.

#### Definisi 10.

Diberikan  $N$  *near-ring*.

- i).  $e \in N$  disebut elemen satuan kiri terhadap operasi pergandaan jika  $(\forall a \in N) ea = a$ .
- ii).  $e \in N$  disebut elemen satuan kanan terhadap operasi pergandaan jika  $(\forall a \in N) ae = a$ .
- iii).  $e \in N$  disebut elemen satuan terhadap operasi pergandaan jika  $(\forall a \in N) ea = ae = a$

#### Definisi 11.

Suatu *near-ring*  $N$  dikatakan *near-ring* dengan elemen satuan jika  $N$  memuat elemen netral terhadap operasi pergandaan, yaitu

$$(\exists e \in N) (\forall a \in N) ae = ea = a$$

Contoh 15:

Elemen satuan pada *near-ring*  $F(G)$  adalah fungsi identitas  $e$ , yakni  $e(x) = x, \forall x \in G$ .

Contoh 16

$(Z, +, \cdot), (Q, +, \cdot), (R, +, \cdot)$  dan  $(C, +, \cdot)$  adalah *near-ring* dengan elemen satuan 1.

Pada *near-ring* elemen satuan belum tentu tunggal dan bisa saja yang dimiliki hanya elemen satuan kiri atau elemen satuan kanan. Contoh berikut akan memperlihatkan hal tersebut.

Contoh 17:

Berdasarkan contoh 4 telah diketahui bahwa  $(G, +, \cdot)$  *near-ring*.

Ambil  $a, b, c \in G$  dimana  $b \neq c$ .

Dengan menggunakan operasi pergandaan yang telah didefinisikan diperoleh

$$ab = a \text{ dan } ac = a$$

Terlihat bahwa  $b$  dan  $c$  merupakan elemen satuan kanan dari  $a$  namun  $b \neq c$ .

Terlihat juga bahwa  $G$  tidak memiliki elemen satuan kiri karena  $(\nexists e \in G) (\forall a \in G) ea = a$ .

Teorema berikut memperlihatkan hubungan antara elemen satuan dan sifat abelian pada *near-ring* serta menunjukkan kondisi yang harus dipenuhi oleh  $N$  agar  $N$  abelian.

#### Teorema 3

Diberikan  $(N, +, \cdot)$  *near-ring* dengan elemen satuan  $e$ .

Jika  $(\forall n \in N) n(-e) = -n$  maka  $N$  abelian.

#### Bukti

Diketahui  $(N, +, \cdot)$  *near-ring* dan  $(\forall n \in N) n(-e) = -n$ .

Akan ditunjukkan  $N$  abelian atau

$$(\forall m, n \in N) m + n = n + m.$$

Ambil sebarang  $m, n \in N$ .

$$m + n = [(-m)(-e)] + [(-n)(-e)]$$

$$= (-m - n)(-e)$$

$$= -(-m - n)$$

$$= n + m$$

Karena  $m + n = n + m$  maka terbukti  $N$  abelian.

#### Teorema 4.

Jika  $N$  *near-ring* dengan elemen satuan  $e$  dan  $a \in N$  maka

$$i). (-e)a = -a$$

$$ii). (-e)(-e) = e$$

#### Bukti

- i). Akan ditunjukkan  $-a = (-e)a$  atau invers dari  $a$  adalah  $(-e)a$ .

$$a + (-e)a = e \cdot a + (-e)a$$

$$= (e + (-e))a$$

$$= 0 \cdot a$$

$$= 0$$

$$\text{Jadi } a + (-e)a = 0 \text{ atau } (-e)a = -a.$$

- ii). Dari i). ambil  $a = -e$  diperoleh

$$\begin{aligned}(-e)(-e) &= -(-e) \\ &= e\end{aligned}$$

**Definisi 12.**

Misalkan  $N$  *near-ring* dengan elemen satuan  $e$  dan  $a \in N$ .

- i).  $s \in N$  disebut invers kiri dari  $a$  terhadap operasi pergandaan jika  $sa = e$ .
- ii).  $s \in N$  disebut invers kanan dari  $a$  terhadap operasi pergandaan jika  $as = e$ .
- iii).  $s \in N$  disebut invers dari  $a$  terhadap operasi pergandaan jika  $sa = as = e$ .

Invers perkalian dari  $a$  dinotasikan dengan  $a^{-1}$ .

Pada *near-ring* invers terhadap pergandaan juga belum tentu tunggal. Hal ini akan diperlihatkan dengan contoh berikut.

**Contoh 18**

Berdasarkan Contoh 4 telah diketahui bahwa  $(G, +, \cdot)$  *near-ring*.

Ambil  $a, b, c, d \in G$  dimana  $c \neq d$ .

Karena  $ab = a$  maka dapat dikatakan bahwa  $b$  merupakan elemen satuan kanan dari  $a$ . Selanjutnya,

$$bc = b \text{ dan } bd = b$$

Terlihat bahwa  $c$  dan  $d$  merupakan invers kanan dari  $a$  namun  $c \neq d$ .

**Teorema 5.**

Diberikan  $(N, +, \cdot)$  *near-ring* dengan elemen satuan  $e$  dan  $a, b \in N$ . Jika  $a$  dan  $b$  masing-masing mempunyai invers maka  $ab$  juga mempunyai invers yaitu  $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ .

**Bukti**

Akan ditunjukkan  $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = e$ .

$$\begin{aligned}(ab)(b^{-1}a^{-1}) &= a(bb^{-1})a^{-1} \\ &= aea^{-1} \\ &= aa^{-1} \\ &= e\end{aligned}$$

Karena  $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = e$  maka terbukti  $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ .

**KESIMPULAN**

1. Posisi elemen netral pada pergandaan sebarang elemen dengan elemen netral sangat menentukan apakah hasilnya elemen netral atau bukan.
2. Ciri khusus yang ditambahkan pada suatu *near-ring* membentuk jenis *near-ring* yang baru. Hal inilah sangat membantu dalam mengklasifikasikan *near-ring*.
3. Elemen identitas dan invers suatu elemen tidak tunggal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A. Adkins, William, dkk. *Algebra*. (1992) Springer. New York.
- Pilz, Günter. (1983) *Near-Rings*. North-Holland. New York.
- Abbasi, S. Jaban. Iqbal, Kahkashan. (2007). *On Near-Integral Domain*. Technology Forces. Pakistan

