

Identifikasi Kerusakan Ekosistem Mangrove di Wilayah PLTD Poka Kota Ambon

Identification of Mangrove Ecosystem Damage in the PLTD Poka Area, Ambon City

Wanti Sairmorsa¹, Edward. G. Tetelepta^{1*}

Program studi Pendidikan Geografi FKIP, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*Corresponding Author

E-mail: edwardunm@gmail.com

ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0009-1158-552X>

Article Info: Submitted: 04 Februari 2024 | Revised: 16 Februari 2024 | Accepted: 10 Mei 2024 | Published 30 Juni 2024

Abstrak: Indonesia, sebagai pemilik ekosistem mangrove terbesar di dunia, memiliki peran penting dalam ekologi, sosial-ekonomi, dan budaya. Mangrove yang tumbuh di daerah pasang surut memberikan perlindungan pantai, sumber ikan, dan manfaat ekologis lainnya. Namun, mangrove rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia seperti eksploitasi berlebihan dan pembuangan sampah, serta konversi lahan yang berfokus pada ekonomi, yang menyebabkan degradasi ekosistem. Faktor-faktor seperti pencemaran minyak dan limbah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami kondisi alami dan eksperimen untuk menguji teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial di daerah mangrove harus diperhatikan. Meskipun suhu, salinitas, dan kualitas air masih dalam batas yang diizinkan, peningkatan logam berat seperti minyak oli terlarut mengancam ekosistem mangrove. Perubahan jenis tumbuhan mangrove terdeteksi, mengindikasikan potensi ancaman terhadap keberlanjutan mereka. Masalah sosial seperti pembuangan sampah sembarangan juga menghambat pertumbuhan mangrove. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan sangat diperlukan.

Kata Kunci: Ekosistem, Identifikasi, Kerusakan, Mangrove

Abstract: *Indonesia, as the owner of the largest mangrove ecosystem in the world, plays a crucial role in ecology, socio-economics, and culture. Mangroves growing in tidal areas provide coastal protection, fish resources, and other ecological benefits. However, mangroves are vulnerable to damage from human activities such as overexploitation, waste disposal, and land conversion focused on economic development, which leads to ecosystem degradation. Factors such as oil pollution and waste pose serious threats to the sustainability of this ecosystem. This study employs qualitative methods with a descriptive approach to understand natural conditions and experiments to test theories. The results indicate that physical, chemical, biological, and social factors in mangrove areas must be carefully considered. Although temperature, salinity, and water quality remain within permissible limits, the increase in heavy metals, such as dissolved oil, threatens the mangrove ecosystem. Changes in mangrove species have also been detected, indicating potential threats to their sustainability. Social issues, such as improper waste disposal, further hinder mangrove growth. Therefore, sustainable protection and management are essential.*

Keywords: *Ecosystem, Identification, Damage, Mangroves*

Citation Guide: Sairmorsa, W., Tetelepta, E.G. (2024). Identifikasi Kerusakan Ekosistem Mangrove di Wilayah PLTD Poka Kota Ambon. *GEOFORUM Jurnal Geografi dan Pendidikan Geografi*, 3 (1), 28-34. <https://doi.org/10.30598/geoforumvol3iss1pp28-34>



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai kawasan ekosistem mangrove terluas di dunia, memiliki peranan ekologi, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya yang sangat penting, seperti menjaga stabilitas pantai, menyediakan sumber ikan, udang, dan keanekaragaman hayati, memberikan sumber kayu bakar dan kayu bangunan, serta berfungsi sebagai area konservasi, pendidikan, ekoturisme, dan identitas budaya (Setyawan & Winarno, 2006). Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis, terdiri dari beberapa spesies pohon mangrove yang dapat tumbuh dan berkembang di daerah pasang surut pantai berlumpur. Habitat ini biasanya terletak pada daerah intertidal dan subtidal yang mendapat aliran air cukup, serta dilindungi dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat, menjadikannya umum ditemukan di pantai-pantai teluk dangkal, estuaria, delta, dan daerah pantai yang terlindung (Keninish, 1990).

Hutan mangrove merupakan ekosistem pantai yang terletak di wilayah pesisir yang secara teratur tergenang oleh air laut dan dipengaruhi oleh pasang surut, namun tidak terlalu dipengaruhi oleh iklim. Terdiri dari beberapa spesies pohon dan semak khas yang dapat tumbuh dalam perairan asin, hutan mangrove umumnya mencakup sembilan genus tumbuhan seperti *Avicennia*, *Snaeda*, *LAGUNULARIA*, *Lumnitzera*, *Conocarpus*, *Aegicera*, *Aegialitis*, *Rhizophora*, *Brugiera*, *Ceriops*, dan *Sonneratia*. Ciri khas dari hutan mangrove termasuk adanya akar napas (*pneumatofor*), zonasi berdasarkan tipe tumbuhan seperti *Avicennia/Sonneratia*, *Rhizophora*, *Bruguiera*, *Ceriops*, dan *Nypa*, serta kemampuannya tumbuh pada substrat tanah berlumpur atau berpasir dengan salinitas yang bervariasi. (Nybakken, 1982).

Menurut (Pramudji, 2000) hutan mangrove rentan terhadap kerusakan ketika

keseimbangan lingkungan terganggu. Tidak hanya dipengaruhi oleh proses alami, tetapi juga oleh tindakan manusia. Eksploitasi berlebihan atas hutan mangrove untuk memenuhi kebutuhan manusia sering kali terjadi tanpa memperhatikan prinsip-prinsip konservasi (Siswanto, 2017). Tuntutan pembangunan yang menitikberatkan pada aspek ekonomi dengan fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti konversi hutan mangrove, telah terbukti menjadi pemicu kerusakan ekosistem mangrove dan degradasi lingkungan pantai. (Anugra, et al., 2014).

Di daerah mangrove, kondisi fisik yang ditandai oleh gerakan air yang minim menyebabkan partikel-partikel sedimen halus cenderung mengendap dan mengumpul di dasar, membentuk lumpur halus yang menjadi substrat dasar bagi ekosistem hutan mangrove (Kusmana, et al., 1997). Pengamatan dan wawancara terkait faktor sosial-ekonomi masyarakat mengindikasikan bahwa salah satu aktivitas yang signifikan berkontribusi terhadap kerusakan hutan mangrove adalah konversi lahan secara permanen untuk kepentingan lain, seperti pembukaan lahan tambak, pemukiman, dan persawahan (deforestasi).

Kerusakan hutan mangrove mencakup perubahan kondisi fisik, baik biotik maupun abiotik, dalam ekosistem mangrove yang menyebabkannya kehilangan keutuhan dan mengalami kerusakan, yang bisa dipicu oleh faktor alam maupun campur tangan manusia. Fakta bahwa sebagian manusia mencapai pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara mengintervensi ekosistem mangrove menjadi penyebab signifikan dari kerusakan ekosistem tersebut. (Ramena, et al., 2020). Desa Poka, yang terletak di Kecamatan Teluk Ambon, mengalami kerusakan ekosistem mangrove yang signifikan. Puluhan pohon mangrove di kawasan tersebut, terutama di depan

pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), mati akibat tumpahan limbah dari perusahaan listrik negara (PLN). Kondisi ini disebabkan oleh limbah domestik yang sering dibuang ke pesisir pantai oleh masyarakat setempat. Hasil laboratorium dari Dinas Lingkungan Hidup Maluku awalnya menyatakan bahwa mangrove di depan PLN Poka tidak mati karena limbah PLN, namun indikasi ini diperdebatkan oleh hasil uji laboratorium dari Pusat Geologi Bandung. Uji tersebut menunjukkan bahwa puluhan pohon mangrove mati dan layu akibat titik limbah yang melebihi ambang batas, terutama dari bocornya pipa minyak PLN dan radiator air panas. Situasi ini menunjukkan eskalasi serius kerusakan lingkungan di Desa Poka dan menekankan urgensi penanganan serta perlindungan terhadap ekosistem mangrove yang rentan tersebut (Dinamikamaluku.com, 2022).

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menghasilkan dan menganalisis data dengan pendekatan deskriptif, melibatkan transkripsi wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi berupa gambar atau foto ([Poerwandari 2013](#)). Setelah mendapatkan hasil, dilakukan metode eksperimen, suatu percobaan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran suatu teori ([Hasan Alwi 2005](#)).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sebuah jenis desain penelitian yang umumnya digunakan untuk mempelajari objek penelitian dalam kondisi alami atau nyata, tanpa adanya pengaturan seperti dalam eksperimen ([Leuwol et al., 2023](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, fokus akan diberikan pada identifikasi kerusakan ekosistem mangrove di PLTD Desa Poka, Kota Ambon. Pendekatan empiris digunakan untuk menjawab permasalahan dengan mengumpulkan data yang relevan, dan metode eksperimen dilakukan dengan

percobaan yang sistematis dan terencana untuk membuktikan kerusakan ekosistem mangrove di Desa Poka. Hasil wawancara dan informasi dari warga lokal menunjukkan bahwa kerusakan mangrove terjadi mendadak pada bulan Mei 2022, sedangkan pada tahun 2021 masih terlihat tumbuhan mangrove yang hidup. Warga melaporkan adanya kematian atau kerusakan mangrove yang disebabkan oleh limbah oli, yang masih terlihat menempel pada tanaman mangrove. Sebagai respons terhadap situasi ini, warga bekerjasama dengan beberapa instansi seperti PLN, LIPI, Angkatan Muda (AM), dan Dinas Kota. Bersama-sama, mereka melakukan pembersihan area mangrove dan menanam kembali mangrove sebanyak lima kali dengan total 500-1.000 anakan. Penanaman dilakukan dengan jarak 1 meter antara satu mangrove dengan mangrove lainnya, dan dilakukan pada kondisi surut air laut. Langkah ini diharapkan dapat membantu memulihkan ekosistem mangrove yang terdampak kerusakan, dan selanjutnya, hasil penelitian akan dibahas berdasarkan variabel-variabel yang telah dirumuskan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap situasi ini.

1. Faktor Fisik

Salinitas, yang merujuk pada konsentrasi garam dalam air, menjadi faktor krusial dalam pertumbuhan mangrove. Mangrove tumbuh di perairan payau atau berair garam, dan berbagai spesies mangrove memiliki tingkat toleransi yang berbeda terhadap salinitas.. Informasi ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi ekosistem mangrove di daerah tersebut dan membantu dalam mengembangkan strategi konservasi yang lebih efektif.

2. Faktor Kimia

Peningkatan konsentrasi logam berat dalam lingkungan alam, disebabkan oleh berbagai faktor fisik yang mempengaruhi ekosistem, ditemukan dalam hasil penelitian di Desa Poka, yang memberikan gambaran spesifik terkait tingkat dan distribusi logam berat di wilayah tersebut.

Di area mangrove terdeteksi keberadaan cairan minyak yang

mengkhawatirkan. Selama proses pemboboran tanah dengan kedalaman 1 meter, terlihat cairan minyak ketika tanah tersebut dijatuhkan ke dalam air. Warga setempat menyebutkan bahwa minyak tersebut berasal dari limbah oli yang dibuang oleh PLN, dan hingga kini sisa-sisa minyak masih terdapat pada akar-akar mangrove. Kontaminasi minyak ini sudah berlangsung selama satu tahun, dan minyak oli tersebut dianggap sebagai zat beracun yang dapat menghentikan dan merusak sel jaringan pada tumbuhan mangrove. Keberlanjutan kondisi ini dapat berdampak serius terhadap ekosistem mangrove, memerlukan tindakan cepat dan efektif untuk membersihkan dan mengatasi dampak pencemaran yang telah terjadi.

3. Faktor Biologi

Pada aspek biologi, dilakukan pengambilan data terkait vegetasi mangrove dan tingkat kerusakan mangrove. Data tersebut diperoleh dengan melakukan survei di Desa Poka, dan informasi dari warga setempat mengindikasikan bahwa kematian mangrove terjadi pada tahun sebelumnya. Perubahan signifikan terlihat dari mangrove yang pada awalnya hidup menjadi mangrove yang mati. Tingkat kerusakan mangrove diukur dengan memperhatikan tiga tingkat, yakni pada pohon mangrove, mangrove sedang, dan mangrove semai (Komang *et al.*, 2021). Lokasi penelitian dibagi menjadi tiga blok dengan ukuran 10x10 meter, di mana setiap blok memiliki vegetasi mangrove yang berbeda.

Selain aspek vegetasi dan tingkat kerusakan mangrove, penelitian ini juga memperhatikan karakteristik tanah di setiap blok penelitian. Blok A ditandai dengan tekstur tanah yang berlumpur, sementara Blok B memiliki karakteristik tanah yang sedikit berlumpur, berpasir, dan berbatu. Blok C, di

sisi lain, memiliki tekstur tanah yang cenderung berpasir dan berbatu. Variasi ini mengindikasikan perbedaan kondisi ekologis yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mangrove. Di lokasi penelitian, terdapat beberapa jenis mangrove yang mendominasi, termasuk *Rhizophora*, *Avicennia*, *Sonneratia*, *Ceriops*, dan *Bruguiera*. Pengamatan terhadap karakteristik tanah dan jenis mangrove yang tumbuh di setiap blok dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang adaptasi mangrove terhadap kondisi lingkungan yang berbeda-beda di Desa Poka.

4. Faktor Sosial Masyarakat

Aspek sosial penelitian ini melibatkan pengambilan data secara manual dengan melihat langsung interaksi manusia dengan lokasi penelitian. Pembuangan sampah secara sembarangan oleh masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang memicu kerusakan ekosistem mangrove. Pada lokasi penelitian, terdapat berbagai jenis sampah seperti plastik, kayu, pecahan kaca, dan sampah lainnya yang sangat melimpah. Sebanyak 100% sampah plastik dan kayu serta sekitar 50% pecahan kaca terdistribusi di sekitar mangrove yang tumbuh. Pembuangan sampah ini telah menyebabkan kerusakan pada akar pasak yang tumbuh di laut, mengakibatkan penurunan luas permukaan respirasi dan kemampuan tanaman untuk mengambil unsur hara dari lingkungan sekitarnya, yang pada akhirnya menurunkan pertumbuhan pohon mangrove (Lestari *et al.*, 2015; Azharil *et al.*, 2023). Dari sini, terlihat bahwa keberadaan sampah menyebabkan penyumbatan yang menghambat proses pertumbuhan mangrove secara signifikan. Upaya pengelolaan sampah yang lebih baik dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan ekosistem mangrove menjadi krusial untuk melindungi dan memulihkan ekosistem tersebut (Ritohardoyo *et al.*, 2014)

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Sampel Parameter Fisika, Kimia Dan Biologi

No	Parameter	Satuan	Hasil	Kadar Maksimum
A. Fisika				
1	Suhu	°C	26.8	Alami
2	Jumlah Zat Padat Tersuspensi (TTS)	Mg/l	0.018	80
3	Kekeruhan	NTU	0.21	5
4	Kebauan	-	Tidak Berbau	Alami
B. Kimia				
1	DO	Mg/l	1.45	>5
2	BOD	Mg/l	38.1	20
3	Salinitas	%	32.86	Alami
4	Kromium (cr)	Mg/l	0	0.005
5	Nitrat (Sebagai NO ₃)	Mg/l	0.01	0.06
6	OrtoFosfal (PO ₄)	Mg/l	0	0.015
7	Amonia Total (NH ₃ -N)	Mg/l	0	0.3
8	PH		7.89	7-8,15
9	Minyak Lemak	Mg/l	0.021	1
10	Detergen	Mg/l	0.01	1
11	Zeng	Mg/l	0	0.05
12	Kadmium	Mg/l	0	0.001
13	Timbal	Mg/l	8.41	0.005
14	Tembaga	Mg/l	0	0.008
15	Nikel	Mg/l	0	0.05
C. Mikrobiologi				
1	Total Koliform	Jumlah /100 ml	12	1000

Sumber: Data Primer Hasil Uji Laboratorium

Tabel 2. Tingkat Kerusakan Mangrove

Blok	Vegetasi	Hidup	Mati	Tumbuhan
A	Pohon	5	12	Anakan Nipa
	Sedang	15	5	(<i>Nypa fruticans</i>)
	Semai	50	-	
B	Pohon	20	9	Ki Tolod
	Sedang	70	-	(<i>Isotoma longiflora</i>)
	Semai	20	-	
C	Pohon	-	-	
	Sedang	50	-	Tidak ada
	Semai	30	-	

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Faktor Fisik, Hasil analisis dari Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku menunjukkan bahwa parameter fisika dan kimia, seperti suhu, TTS, kekeruhan, kebauan, DO, BOD, salinitas, kromium, nitrat, ortofosfat, amonia, pH, minyak lemak, detergen, seng, kadmium, timbal, tembaga, nikel, dan total koliform, memenuhi standar maksimum yang diperbolehkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi fisik dan kimia lingkungan di daerah mangrove masih dalam batas yang diperbolehkan.
2. Faktor Kimia, Penelitian di daerah mangrove menunjukkan peningkatan logam berat, terutama cairan minyak oli terlarut, yang dapat menyebabkan henti dan kematian sel jaringan pada tumbuhan mangrove. Hal ini menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kesehatan ekosistem mangrove akibat kontaminasi kimia.
3. Faktor Biologi, Penelitian menunjukkan perubahan jenis tumbuhan mangrove, dengan beberapa yang masih hidup, namun banyak yang terancam mati atau rusak pada tahun 2022. Ini mencakup mangrove pohon, mangrove sedang, dan mangrove kecil/semai. Perubahan ini menggambarkan dampak negatif terhadap keberlanjutan tumbuhan mangrove di daerah tersebut.
4. Faktor Sosial, Pembuangan sampah secara sembarangan di daerah mangrove menjadi masalah serius, dengan keberadaan sampah plastik, sampah kayu, pecahan kaca, dan sampah lainnya yang berlimpah. Sampah tersebut menyebabkan penyumbatan yang menghambat pertumbuhan mangrove, menunjukkan dampak negatif dari perilaku sosial terhadap lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A, F., Umar, H., dan Toknok, B. (2014) 'Tingkat Kerusakan Hutan Mangrove Pantai di Desa Malakosa Kecamatan

Balinggi Kabupaten Parigi Moutong', *Warta Rimba*, 2(1), pp. 54–61.

Akken J.W (1982) 'Biologi Laut', *Suatu pendekatan Ekologis*. Gramedia. Jakarta [Preprint].

Azharil, M.Y. and Paskah, I. (2023) 'Bahaya Sampah Plastik Di Laut Bagi Mahluk Hidup', *Riset Sains dan Teknologi Kelautan*, 6(2), pp. 174–177. Available at: <https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i2.31704>.

Dinamikamaluku.com, by R. (2022) 'Ratusan Mangrove Mati di Poka Karean Limbah, IKAPATTI: Kita Gugat dan Demo PLn'.

Hasan, Alwi, D. (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.

Keninich, M.. (1990) 'Ekologi Muara. Jilid II', *Aspek Biologis*. CRC Press Inc. Boca Raton Florida [Prepr Akken, J. W. (1982). Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis. Gramedia.

Anugra, F. U., & Toknok, B. (2014). Tingkat kerusakan hutan mangrove pantai di Desa Malakosa Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong. *Warta Rimba*, 2(1), 54-61.

Azharil, M. Y., & Paskah, I. (2023). Bahaya sampah plastik di laut bagi mahluk hidup. *Riset Sains dan Teknologi Kelautan*, 6(2), 174-177. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i2.31704>

Dinamikamaluku.com. (2022). Ratusan mangrove mati di Poka karena limbah: IKAPATTI gugat dan demo PLN.

Hasan, A. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.

Keninich, M. (1990). *Ekologi Muara, Jilid II: Aspek Biologis*. CRC Press Inc.

Komang, P., et al. (2021). Struktur vegetasi mangrove berdasarkan karakteristik substrat di Pantai Karang Sewu Gilimanuk Bali. *Bonorowo Wetlands*, 4(1), 29-36.

Lestari, F., & Kusmana, C. (2015). The effect of waste on chlorophyll content of leaves and regeneration of mangrove forest at Angke Kapuk Protection Forest Jakarta. *Bonorowo Wetlands*, 5(2), 77-84.

<https://doi.org/10.13057/bonorowo/w>

- 050203
- Leuwol, F. S., et al. (2023). Pengaruh kualitas lingkungan terhadap kesejahteraan psikologis individu di Kota Metropolitan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(08), 714-720. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i08.592>
- Poerwandari, K. (2013). Jenis penelitian kualitatif. *Journal Penelitian*, 1(69), 34.
- Pramudji. (2000). Dampak perilaku manusia pada ekosistem hutan mangrove di Indonesia. *Ocean*, xxv(2), 12-20.
- Ramena, G. O., et al. (2020). Pengaruh aktivitas masyarakat terhadap ekosistem mangrove. *Jurnal Spasial*, 7(3), 343-351.
- Ritohardoyo, S., & Ardi, G. B. (2014). Media informasi pengembangan ilmu dan profesi kegeografian untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan kondisi hutan mangrove di Indonesia. *Jurnal Geografi*, 11(1), 43-57.
- Setyawan, A. D., & Winarno, K. (2006). Conservation problems of mangrove ecosystem in coastal area of Rembang Regency Central Java. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 7(2), 159-163. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d070214>
- Siswanto, H. (2017). Pengaruh metode pembelajaran dan persepsi tentang lingkungan terhadap kepedulian taruna pada pelestarian laut. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 11(1), 49-70. <https://doi.org/10.21009/plpb.111.03>
- Sairmorsa, W., & Tetelepta, E. G. (2024). Identification of mangrove ecosystem damage in the PLTD Poka area Ambon City. *GEOFORUM: Jurnal Geografi dan Pendidikan Geografi*, 3(1), 28-34. <https://doi.org/10.30598/geoforumvol3iss1pp28-34intj>.
- Komang, P. et al. (2021) 'Struktur Vegetasi Mangrove berdasarkan Karakteristik Substrat di Pantai Karang Sewu, Gilimanuk Bali', 4(1), pp. 29–36.
- Lestari, F. and Kusmana, C. (2015) 'The effect of waste on chlorophyll content of leaves and regeneration of mangrove forest at Angke Kapuk Protection Forest, Jakarta', *Bonorowo Wetlands*, 5(2), pp. 77–84. Available at: <https://doi.org/10.13057/bonorowo/w050203>.
- Leuwol, F.S. et al. (2023) 'Pengaruh Kualitas Lingkungan Terhadap Kesejahteraan Psikologis Individu di Kota Metropolitan', *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(08), pp. 714–720. Available at: <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i08.592>.
- 'Litter production of a mangrove forest in East Sumatera, Indonesia' (1997) *Indonesian Journal of Tropical Agriculture*, 8(3), pp. 52–59.
- Poerwandari, K. (2013) 'Jenis Penelitian Kualitatif', *Journal Penelitian*, 1(69), p. 34.
- Pramudji (2000) 'Dampak Perilaku Manusia Pada Ekosistem Hutan Mangrove Di Indonesia', *Dalam Ocean*, xxv(2), pp. 12–20.
- Ramena, G.O. et al. (2020) 'Pengaruh Aktivitas Masyarakat Terhadap Ekosistem Mangrove', *Jurnal Spasial*, 7(3), pp. 343–351.
- Ritohardoyo, S. and Ardi, G.B. (2014) 'Media informasi pengembangan ilmu dan profesi kegeografian untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan kondisi hutan mangrove di Indonesia', *Jurnal Geografi*, 11(1), pp. 43–57.
- Setyawan, A.D. and Winarno, K. (2006) 'Conservation problems of mangrove ecosystem in coastal area of Rembang Regency, Central Java', *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 7(2), pp. 159–163. Available at: <https://doi.org/10.13057/biodiv/d070214>.
- Siswanto, H. (2017) 'Pengaruh Metode Pembelajaran Dan Persepsi Tentang Lingkungan Terhadap Kepedulian Taruna Pada Pelestarian Laut', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 11(1), pp. 49–70. Available at: <https://doi.org/10.21009/plpb.111.03>.